

**Phenformine (Dibotin) dans la polyarthrite****RÉSUMÉ**

On compare par la méthode de "double-blind cross-over" la phenformine (Dibotin) à un placebo chez 20 malades atteints de polyarthrite rhumatoïde active. On ne trouva qu'un seul effet statistiquement significatif: la réduction de la vitesse de sédimentation globulaire (VSG). Une légère amélioration de la force de la main chez les malades traités par la phenformine fut en dessous des limites de signification, mais le nombre des cas dans la série fut petit. Il serait possible que l'altération de la VSG au cours du traitement par la phenformine ne soit pas un signe d'amélioration de la condition rhumatoïde mais un résultat de l'action de ce produit sur le taux sanguin du fibrinogène.

La toxicité, se traduisant par des nausées et/ou de la diarrhée, s'observa chez quatre malades et nécessita le retrait de la série de deux d'entre eux.

Dans les cas de polyarthrite évolutive accompagnée d'un diabète, où les corticostéroïdes sont peu indiqués, la phenformine, préféablement sous forme de capsules à dégagement lent, peut être de quelque utilité contre les deux maladies.

**Fenformina (Dibotin) en la poliartritis****SUMARIO**

Se comparó por el método de "double-blind cross-over" la fenformina (Dibotin) con un placebo en 20 enfermos con poliartritis reumatoide activa y se halló sólo un efecto estadísticamente significativo: la reducción de la velocidad de sedimentación eritrocitaria (VSE). La fuerza de la mano mejoró un poco con la fenformina sin alcanzar los límites de significación en el pequeño número de enfermos investigados. Es posible que la alteración de la VSE durante el tratamiento con la fenformina no sea un criterio de mejoría de la condición sino el efecto de este producto sobre la concentración del fibrinógeno en la sangre.

La toxicidad se manifestó por la náusea y/o la diarrea; de cuatro enfermos afectos dos fueron retirados de la investigación.

En casos de poliartritis activa asociada con diabetes, en los cuales los corticosteroides se ven poco indicados, la fenformina, de preferencia en forma de cápsulas a acción lenta, parece tener un cierto valor clínico contra ambas enfermedades.

**CORRECTION**

Oreskes, I., et col. *Ann. rheum. Dis.*, 27, 63, lignes 4 et 12:  
A la place de "de Waaler-Rose" on doit lire: "d'agglutination utilisant des hématies de mouton tannées".

**CORRECCION**

Oreskes, I., y col. *Ann. rheum. Dis.* 27, 63, líneas 3 y 11:  
En lugar de "Waaler-Rose" se debe leer: "de aglutinacion de eritrocitos de cordero curtidos".